

Gewinnung einer STUHLPROBE

Sehr geehrte Patientin,
sehr geehrter Patient,

Ihr Arzt hat Sie aufgefordert,
für Laboruntersuchungen eine
Stuhlprobe zu gewinnen.

Um eine schnelle und sichere
Untersuchung zu unterstützen,
beachten Sie bitte nachfolgende
Hinweise in der Anleitung.

Bei Verdacht auf eine Infektion
mit Parasiten ist es aufgrund
schwankender Parasitenaus-
scheidung empfohlen, zwei bis
drei getrennte Stuhlproben zur
Untersuchung einzusenden.
Der Abstand zwischen den
Proben sollte ein bis drei Tage
betragen.

**Vielen Dank
für Ihre Mitarbeit.**

1



Allgemeine Hinweise

Da Spülwasser die Untersuchung
behindern kann, beseitigen Sie es vor
dem Absetzen des Stuhls.

In der Apotheke sind für die Probe-
nahme im Tiefspül-WC sogenannte
Stuhlfänger erhältlich, die über den
Rand der WC-Brille gespannt werden.
Alternativ eignen sich auch mehrere
Lagen Toilettenpapier, die einfach auf
den Wasserspiegel aufgelegt werden.

2



Gewinnung der Stuhlprobe

Stuhlprobe absetzen.

Mit dem Stuhl-Löffelchen von drei
bis fünf verschiedenen Stellen der
Kotprobe Material entnehmen. Dabei
sind Schleim- und bluthaltige Stellen
besonders geeignet.

Befüllen Sie das Röhrchen möglichst
bis zu zwei Drittel.

3



Lagerung und Transport

Röhrchen mit Namen und Datum
versehen und bis zur Aufarbeitung im
Labor die Probe bitte **kühl** lagern.